

Il tenero, il duro, il burocco, i semi in guscio  
locali e quelle "miglioriste" per essere  
massale, invecchio e multiproposito.  
Il libro introduce alla conoscenza  
frumenti, attraverso i nomi, le  
caratteristiche di forma e peso,  
che ne accompagnano le diverse  
l'elenco e la descrizione di  
nomi (e sinonimi) di varietà di  
duro coltivate in Italia tra il 1800 e il 1950  
e la metà del '900.

Oriana  
a cura di  
**PORFIRI**

# I FRUMENTI

Dalle varietà al campo



pentàgora  
RETE SEMI RURALI

€ 12,00



**MAZZOCONE**

*Varietà di f. tenero, considerata di scarsa importanza, coltivata in prov. di Palermo.* (De Cillis, 1927)

**MENDEL**

*Varietà di f. tenero, selezionata da Strampelli, considerata di recente introduzione.* (De Cillis, 1927)

**MENTANA**

*Varietà di f. tenero, aristata, autunnale, precoce, selezionata da Strampelli nel 1919, dall'incrocio Akagomughi x 67 (Rieti x Wilhelmina Tarwe), coltivata in tutta Italia, mediamente soggetta all'allettamento, straordinariamente resistente alla stretta, moltissimo alle ruggini.* (De Cillis, 1927)

**MENTANA MUTICO**

*Varietà di f. tenero, mutica, autunnale, selezionata da Strampelli dall'incrocio Akagomughi x (Rieti x Wilhelmina Tarwe), spiga rossiccia drilla, piuttosto lasca, culmi abbastanza eretti, resistenti all'allettamento, accostimento normale, maturazione assai precoce.* (Strampelli, 1932)

SINONIMI: Cito Menotti, Rachael.

**MERLIARO: VEDI Cologna.**

**MERLIONE: VEDI Cologna.**

**MESCHIGLIA**

*Varietà locale di f. duro, autunnale, medio-precoce, coltivata in collina (prov. di Roma e Viterbo), ma anche in pianura (Maremma romana), molto resistente all'al-*

*lettamento, alla stretta e alle ruggini.* (De Cillis, 1927)  
SINONIMI: Mischiglia.

**MESCHINO**

*Varietà di f. turgido, considerata di scarsa importanza, coltivata in prov. di Potenza.* (De Cillis, 1927)

**MILANESE**

*Varietà di f. tenero, considerata di scarsa importanza, coltivata in prov. di Potenza.* (De Cillis, 1927)

**MILAZZO**

*Varietà di f. duro, selezionata da Strampelli, considerata di recente introduzione.* (De Cillis, 1927)

**MISCHIA: VEDI Grano grosso.**

**MISCHIGLIA: VEDI Mischiglia.**

**MORU**

*Varietà di f. duro, considerata di scarsa importanza, coltivata in prov. di Cagliari.* (De Cillis, 1927)

**MUCCO: VEDI Genil rosso.**

**NEGRETTO**

*Varietà di f. duro, considerata di scarsa importanza, coltivata in Dalmazia.* (De Cillis, 1927)

**NOË**

*Varietà locale francese (Isola di Noë) di f. tenero, mutica, autunnale, medio-precoce, coltivata soprattutto in Piemonte, in collina e montagna, poco resistente all'al-*